



I WARSZAWSKIE FORUM OKULISTYCZNE

02–03.09.2022

Warszawa

Aktualny sposób postępowania w CSCR z uwzględnieniem typów morfologicznych tego schorzenia

Current options of management of CSCR with the inclusion of morphological subtypes of that disorder

dr hab. n. med. Maciej Gawęcki

Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku

Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

Centralna surowicza chorioretinopatia (CSCR) jest dość częstym schorzeniem dotykającym najczęściej mężczyzn w wieku 30–60 lat. Pomimo, że jednostka ta jest dobrze opisana w piśmiennictwie okulistycznym, do tej pory nie sformułowano jasno rekomendacji dotyczących postępowania w tym schorzeniu. Przez kilka dekad podstawowym zaleceniem w świeżo rozpoznanym CSCR była kilkumiesięczna obserwacja w oczekiwaniu na samoistną remisję. Tymczasem długotrwała nieleczona postać CSCR prowadzi do trwałego upośledzenia widzenia, co ma szczególne znaczenie przy obuocznym przebiegu tej choroby. Obecnie mamy do dyspozycji kilka opcji terapeutycznych, które można zastosować w leczeniu CSCR: klasyczna fotokoagulacja laserowa, podprogowa laseroterapia mikropulsowa oraz doustne inhibitory mineralokortykoidów. Nie istnieją jednak precyzyjne wytyczne, jak wybierać te metody. W prezentacji zostaną przedstawione aktualne trendy w leczeniu CSCR oraz propozycje algorytmów postępowania w tym schorzeniu, uzależnione od jego morfologii oraz casu trwania.

ORGANIZATOR NAUKOWY:

Klinika Okulistyczna
Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej
w Warszawie

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

dr n. med.
Radosław Różycki

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

dr n. med.
Jaromir Wasyluk